


CORRIGÉ

---

**Épreuve de  
Mathématiques**

CRPE 2024 – groupement 1



**ForProf**

## Exercice 1

### Partie A

1. La longueur minimale de l'étiquette est égale au périmètre du cercle de base du cylindre.

Ce périmètre est égal en centimètres à  $\pi \times d = 8,4 \times \pi$   
( $d$  étant le diamètre de la base du cylindre).

La valeur approchée par excès au mm près est égale à 26,4 cm.

2. Soit  $V$  le volume du cylindre. On a  $V = \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 \times h$  avec  $d = 8,4$  cm et  $h = 15$  cm.

La valeur exacte de  $V$  en  $\text{cm}^3$  est  $V = 264,6 \times \pi$ .

Or  $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$ .

$V = 0,2646 \times \pi \text{ L}$  soit **une valeur arrondie de  $V$  au cL près : 0,83 L.**

3. Le courbe n°3 correspond au pluviomètre de Jules. En effet, le volume est proportionnel à la hauteur d'eau. De plus, lorsque la hauteur est égale à 15 cm, c'est la seule courbe qui donne un volume approximatif de  $830 \text{ cm}^3$  (0,83 L).

La courbe n°1 correspond au pluviomètre d'Inès. La partie haute de la bouteille a une forme différente du cylindre : en retournant la bouteille, l'eau montera plus vite que pour la partie basse à volume équivalent, et la hauteur d'eau va donc évoluer plus rapidement au départ.

### Partie B

1. On calcule la moyenne des précipitations des 10 mois pour la ville de Rennes. Cette moyenne, en mm, est égale à  $\frac{65+103+\dots+134}{10} = \frac{648}{10} = 64,8$ .  
En moyenne, c'est la ville de Lyon qui a subi le plus de précipitations au cours des 10 mois (70,6 mm > 64,8 mm).
2. Pour la ville de Rennes, l'étendue est égale à  $134 \text{ mm} - 19 \text{ mm} = 115 \text{ mm}$ .  
Pour la ville de Lyon, l'étendue est égale à  $179 \text{ mm} - 18 \text{ mm} = 161 \text{ mm}$ .  
L'étendue est plus importante dans la ville de Lyon.
3. On sait que la médiane est égale à 58 mm. On en déduit que pendant 5 mois, les précipitations mensuelles étaient supérieures ou égales à 58 mm. On ne peut pas affirmer qu'au cours de 5 mois les précipitations étaient supérieures à 70,6 mm. L'affirmation est fausse.

## Exercice 2

1. 0,28 est un nombre décimal. Tout nombre décimal est un nombre rationnel donc 0,28 est un nombre rationnel.  
**L'affirmation est vraie.**
2. Choisissons  $a = 2$  et  $b = 1$  deux nombres strictement positifs. Le quotient de  $a$  par  $b$  est égal à 2. Le nombre 2 n'est pas strictement inférieur à  $a$ .  
**L'affirmation est fausse.**

3. Tout entier naturel impair est de la forme  $2k+1$  où  $k$  est un entier naturel.  
Posons  $N = 2 \times k + 1$  et  $N' = 2 \times k' + 1$  deux nombres naturels impairs avec  $k$  et  $k'$  des entiers naturels. Le produit de ces deux nombres naturels impairs est  $N \times N'$ .

$$\text{On a : } N \times N' = (2 \times k + 1) \times (2 \times k' + 1).$$

Développons :

$$N \times N' = 4 \times k \times k' + 2 \times k \times 1 + 1 \times 2 \times k' + 1 \times 1$$

soit encore

$$N \times N' = 2(2 \times k \times k' + k + k') + 1$$

Le nombre  $2(2 \times k \times k' + k + k')$  est pair, le nombre  $2(2 \times k \times k' + k + k') + 1$  est donc impair.

**L'affirmation est vraie.**

4. On a  $f(x) = 2x - 1,5$ , on en déduit que  $f(0) = 2 \times 0 - 1,5 = -1,5$  donc  $f(0) \neq 2$ .

**L'affirmation est fausse.**

5. Dans le triangle ABC, on a :

6.

- les points A, D, B et A, E, C sont alignés dans le même ordre.

$$\text{- On a : } \frac{AD}{AB} = \frac{2,4}{7,8} \text{ et } \frac{AE}{AC} = \frac{2,4}{7,8}.$$

$$\text{On en déduit que } \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}.$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (ED) et (BC) sont parallèles.

$$\text{On peut donc écrire : } \frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB}$$

Soit en remplaçant DE, AD et AB par les données de l'énoncé,

$$\frac{2,9}{BC} = \frac{2,4}{7,8}$$

D'où

$$BC = \frac{2,9 \times 7,8}{2,4} = 9,425$$


La longueur BC arrondie au mm près est égal à 9,4 cm.

**L'affirmation est vraie.**

### Exercice 3

#### Partie A

Le patron d'un dé cubique est composé de 6 carrés isométriques. Chaque longueur de côté mesure 3,8 cm.



**NB :** nous ne présentons ici qu'un patron parmi plusieurs possibles : d'autres patrons du cube sont réalisables, ainsi que d'autres agencements de la numérotation des faces.

#### Partie B

1. Lorsqu'on somme deux nombres entiers compris entre 1 et 6, la somme est comprise entre 2 et 12.  
**Les résultats possibles sont : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.**
2. En lançant deux dés, il y a 36 issues possibles. Le dé étant équilibré, on est dans une situation d'équiprobabilité.

Pour obtenir une somme égale à 4, il y a trois issues favorables : « obtenir 1 sur le premier dé et obtenir 3 sur le second », « obtenir 3 sur le premier dé et obtenir 1 sur le second » et « obtenir le numéro 2 sur les deux dés » (cf. tableau ci-dessous).

La probabilité d'obtenir une somme égale à 4 sur les deux dés est donc égale à  $\frac{3}{36}$ , soit  $\frac{1}{12}$ .

	1	2	3	4	5	6
1	(1;1)	(1;2)	(1;3)	(1;4)	(1;5)	(1;6)
2	(2;1)	(2;2)	(2;3)	(2;4)	(2;5)	(2;6)
3	(3;1)	(3;2)	(3;3)	(3;4)	(3;5)	(3;6)
4	(4;1)	(4;2)	(4;3)	(4;4)	(4;5)	(4;6)
5	(5;1)	(5;2)	(5;3)	(5;4)	(5;5)	(5;6)
6	(6;1)	(6;2)	(6;3)	(6;4)	(6;5)	(6;6)

3. a. Remplissons un tableau à double entrée en faisant apparaître les différentes sommes.

2° dé \ 1° dé	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11

6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	----	----	----

On constate que la somme « 7 » est celle qui apparaît le plus souvent.

b. Parmi les 36 issues, il y en a 6 qui permettent d'obtenir une somme égale à 7. La probabilité d'obtenir cette somme est égale à  $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

**Partie C**

Construisons un tableau à double entrée faisant apparaître l'écart entre les deux nombres obtenus.

2° dé 1° dé	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	3	4	5
2	1	0	1	2	3	4
3	2	1	0	1	2	3
4	3	2	1	0	1	2
5	4	3	2	1	0	1
6	5	4	3	2	1	0

Le tableau permet d'affirmer qu'il y a 6 issues donnant un écart nul. La probabilité de l'événement « obtenir un écart nul » (ou « obtenir un double ») est égale à  $\frac{1}{6}$ .

Autre événement possible donnant une probabilité égale à  $\frac{1}{6}$  : « obtenir un écart égal à 3 ».

## Exercice 4

### Partie A

- a. La piste a pour longueur 200 mètres. Il y a 8 plots espacés de la même longueur, l'écart entre deux plots consécutifs est donc égal à 25 mètres.  
Lola a parcouru 4 tours de piste, soit 800 mètres, et a franchi le premier plot dans le tour incomplet. Elle a donc parcouru 25 mètres supplémentaires.  
Au total, Lola a parcouru 800 m + 25 m, soit 825 mètres.

b. Pour calculer la vitesse moyenne  $v$  en m/mn, on utilise la formule :  $v = \frac{d}{t}$  avec  $d$  en mètres et  $t$  en minutes.

$$v = \frac{825}{5} = 165$$

La vitesse moyenne de Lola est donc de 165 m/mn.

- Jonas a parcouru 700 mètres (ou 0,7 km) en 5 minutes (soit  $\frac{5}{60}$  h). Sa vitesse moyenne  $v$  en km/h est égale :

$$v = \frac{0,7}{\frac{5}{60}} = \frac{0,7 \times 60}{5} = 8,4$$

La vitesse moyenne de Jonas est égale à 8,4 km/h.

- $\frac{825-700}{700} = \frac{125}{700} = \frac{5}{28} \approx 0,179$

Le pourcentage d'augmentation est égal à 18%, pourcentage donné à l'unité près.

### Partie B

- En D2, on peut écrire « =200\*B2+25\*C2 ».
- En E2, on peut écrire « =12\*D2/1000 » ou « =0,012\*D2 »  
**NB** : ici, la valeur 12 correspond à  $\frac{60}{5}$ , rencontrée dans la question 2 de la partie A.
- La distance moyenne en mètres est égale à  $\frac{17\,275}{25}$ , soit 691 mètres.

### Partie C

- a.  $\frac{L}{l} = \frac{5}{3}$  soit  $l = \frac{3}{5} \times L = 0,6 \times L$

Pour  $L = 20$ , on obtient  $l = 0,6 \times 20 = 12$ .

Pour une longueur de 20 mètres, on obtient une largeur de 12 mètres.

b. La longueur totale de la piste est égale à 2 fois la longueur  $L$  du rectangle augmentées de 2 demi-périmètres d'un cercle de diamètre  $(0,6 \times L)$ .

Calculons :  $2 \times L + 2 \times \pi \times 0,6 \times L$  avec  $L = 20$ .

$$2 \times 20 + 2 \times \pi \times \frac{0,6 \times 20}{2} = 40 + 12 \times \pi.$$

La mesure exacte de la longueur de la piste en mètres est égale à  $40 + 12 \times \pi$ .

La mesure arrondie de la longueur de la piste au mètre près est égale à **78 mètres**.

2. Soit  $L$  la longueur en mètres du rectangle. On a vu précédemment que la largeur  $l$  du rectangle est égale à  $l = 0,6 \times L$  mètres.

Calculons la longueur en mètres de la piste lorsque la longueur du rectangle est égale à  $L$  mètres.

$$\text{Longueur de la piste (en mètres)} = 2 \times L + 2 \times \pi \times \frac{(0,6 \times L)}{2} = 2 \times L(1 + 0,3 \times \pi).$$

Si la longueur de la piste est égale à 200 mètres, on est amené à résoudre l'équation d'inconnue  $L$  :  $2 \times L(1 + 0,3 \times \pi) = 200$ .

$$\text{Soit encore } L(1 + 0,3 \times \pi) = 100$$

$$\text{On en déduit que } L = \frac{100}{1 + 0,3 \times \pi} \approx 51,481.$$

La valeur arrondie de la longueur au centimètre près 51,48 mètres.

La valeur arrondie de la largeur au centimètre près est égale  $0,6 \times L = 0,6 \times \frac{100}{1 + 0,3 \times \pi}$ , soit 30,89 mètres (valeur arrondie au cm près).

## Exercice 5

### **Partie A**

1. Pour construire le tour du géoplan de 25 picots, il faut placer 4 carrés sur la première ligne, 4 autres sur la dernière ligne et compléter par deux carrés la première colonne et 2 autres carrés sur la dernière colonne.  
Au total, l'élève a donc besoin de construire 12 carrés ( $4+4+2+2$ ).
2. Un géoplan de 81 picots est composé de neuf picots par ligne. Il y a 9 lignes et de 9 picots par colonne.  
Pour réaliser le tour du géoplan, il faut construire 8 carrés sur la première ligne et sur la dernière ligne. Il faut ensuite compléter avec 6 carrés ( $8-2$ ) sur la première colonne et sur la dernière colonne.  
Au total, le nombre de carré nécessaire pour réaliser le tour du géoplan de 81 picots est égal à  $8+8+6+6$ , soit 28 carrés.
3. Soit  $n$  un nombre supérieur ou égal 2. Un géoplan de  $n^2$  picots est composé de  $n$  picots par ligne et de  $n$  picots par colonne.  
Pour réaliser le tour de ce géoplan, il faut construire  $(n - 1)$  carrés sur la première ligne et sur la dernière ligne. Il faut ensuite compléter avec  $(n - 1 - 2)$  carrés (soit  $n - 3$  carrés) sur la première colonne et sur la dernière colonne.  
Au total, le nombre de carrés nécessaires est égal à  $(n - 1) + (n - 1) + (n - 3) + (n - 3)$ , soit encore  $(4n - 8)$  carrés.
4. D'après la question précédente, le nombre de carrés nécessaires pour réaliser le tour d'un géoplan de  $n^2$  picots est égal à  $4n - 8$ .



On est ramené à résoudre l'équation d'inconnue  $n$  :

$$\begin{aligned}4n - 8 &\leq 107 \\4n - 8 + 8 &\leq 107 + 8 \\4n &\leq 115 \\n &\leq \frac{115}{4}\end{aligned}$$

Or


$$\frac{115}{4} = 28,75$$

Comme  $n$  est un entier naturel,  $n$  est inférieur ou égal à 28.

Le nombre maximal de picots de ce géoplan est égal à  $28^2$  soit 784.

### Partie B

1.



2. a. La figure est un trapèze rectangle dont la petite base a pour longueur 3 cm, de longueur de grande base 12 cm et de hauteur 9 cm.

L'aire de ce trapèze est égale à  $\frac{(3+12) \times 9}{2}$  cm<sup>2</sup> soit **67,5 cm<sup>2</sup>**.

- b. Pour déterminer le périmètre de ce trapèze, il convient de calculer la longueur de la diagonale d'un carré de côté 9 cm.

La longueur de cette diagonale est égale à  $9\sqrt{2}$  cm. (application directe du théorème de Pythagore).

Le périmètre de la figure est égal à  $(3 + 3 \times 3 + 4 \times 3 + 9\sqrt{2})$  cm, soit encore  $(24 + 9\sqrt{2})$  cm.

3. Valeur attribuée à A = 45 (rotation d'angle  $45^\circ$ )

Valeur attribuée à B = 297 ( $9\sqrt{2} \approx 12,73$ , l'échelle choisie est de 1 cm pour  $\frac{70}{3}$  pas et  $9\sqrt{2} \times \frac{70}{3} \approx 297$ )

Valeur attribuée à C = 135 (rotation d'angle  $45^\circ + 90^\circ$ )

```
quand est cliqué
effacer tout
aller à x: -140 y: 140
s'orienter à 90
stylo en position d'écriture
mettre la taille du stylo à 3
avancer de 210 pas
tourner de 90 degrés
avancer de 70 pas
tourner de 45 degrés
avancer de 297 pas
tourner de 135 degrés
avancer de 280 pas
relever le stylo
```

Valeur de A

Valeur de B

Valeur de C